

Abécédaire pour site internet

Termes médicaux	Définition
Alopecia areata	Synonyme de pelade. Terme utilisé par les anglo-saxons.
Alopécie	Perte diffuse ou localisée, aiguë ou chronique, partielle ou totale des poils et/ou des cheveux. Ce mot vient du grec <i>alôpêx</i> qui veut dire renard et <i>alopêkia</i> maladie qui fait tomber les poils du renard.
Alopécie androgénétique	Alopécie d'origine génétique et hormonale qui ne peut débuter qu'après la puberté en présence d'hormones masculines. Atteint surtout les hommes et s'aggrave progressivement avec l'âge. (voir fiche : lien vers Alopécie androgénétique masculine). Chez la femme, l'atteinte est diffuse et moins sévère (voir fiche : lien vers Alopécie androgénétique féminine).
Alopécie cicatricielle	Alopécie au cours de laquelle, la racine du cheveu est détruite et remplacée par une cicatrice fibreuse. Le cuir chevelu est lisse et les repousses ne sont pas possibles.
Alopécie congénitale	Alopécie présente dès la naissance.
Alopécie occipitale du nourrisson	Phénomène normal dû à la chute et au renouvellement des cheveux au-dessus de la nuque dans les mois qui suivent la naissance. Ce phénomène peut être accéléré par le frottement de la tête sur l'oreiller.
Alopécie par traction	Alopécie secondaire à des tractions répétées : tresses, chignons, nattes, tissage, postiche... cette alopécie est réversible au début mais peut devenir définitive si les phénomènes de traction persistent.
Alopécie séborrhéique	Ancien terme pour désigner une alopécie androgénétique.
Angiome	Prolifération localisée de vaisseaux soit dilatés, soit trop nombreux.
Angiosarcome	Tumeur vasculaire maligne, très rare pouvant se développer au niveau du cuir chevelu chez les personnes âgées.
Anhidrose	Disparition de la sécrétion sudorale eccrine c'est-à-dire disparition de la transpiration.
Annexes épidermiques	Les annexes épidermiques comprennent les poils, les cheveux, les ongles et les glandes sudorales.
Anonychie	Absence de développement d'un ou de plusieurs ongles.
Anthraline	Produit autrefois utilisé dans le traitement du psoriasis et parfois utilisé dans le traitement de la pelade en application locale. Ce produit est irritant et peut-être salissant.
Anti-androgène	Produit qui bloque l'action des hormones androgènes (hormones masculines).
Anti-perspirant	Produit qui réduit la transpiration.
Antisudoral	Voir anti-perspirant.
Aplasia cutanée congénitale du cuir chevelu	Absence localisée de peau au niveau de la zone médiane du cuir chevelu sous forme de petites plaques sans cheveux parfois ulcérées, cicatrisant spontanément. Une réparation chirurgicale est parfois nécessaire mais le pronostic est bon.
Arrecteur	Voir muscle pilo arrecteur.
Atrichie	Absence totale des poils.
Biopsie cutanée	Prélèvement sous anesthésie locale d'un petit morceau de peau ou d'un petit morceau de cuir chevelu pour analyse au microscope. (voir cette fiche : lien vers cette fiche).
Botriomycome	Petite tumeur vasculaire, bénigne se développant en général après une plaie, sur le cuir chevelu mais également les doigts, les lèvres et les extrémités.
Bourgeon charnu	Voir botriomycome.
Bowen (Maladie de)	Tumeur intra-épithéliale, superficielle, se développant plutôt sur les zones ayant été exposées au soleil sous formes de plaques rouges, avec parfois des squames et des contours bien dessinés. Nécessite un traitement local ou une exérèse chirurgicale. En l'absence de traitement, une dégénérescence est possible en quelques années.
Brocq (Pseudo-pelade de)	Alopécie cicatricielle en petites plaques discrètement inflammatoires et évoluant de façon très lente. A différencier du lichen plan pileux (voir cette fiche : lien vers cette fiche) et du lupus

	érythémateux chronique (voir cette fiche : lien vers cette fiche).
Bulbe pileaire	Structure arrondie à la base des follicules pileux. C'est au niveau du bulbe pileaire que le cheveu est fabriqué.
Bulge	Renflement de la gaine épithéliale du poil, bien visible chez la souris, moins visible chez l'homme, située au niveau de la zone d'insertion du muscle pilo-arrecteur. Cette zone sert de réservoir aux cellules souches épidermiques du follicule pileux.
Calcipotriol	Analogue structural de la Vitamine D, utilisé sous forme de lotion seul, ou associé à un corticoïde pour traiter le psoriasis du cuir chevelu.
Calvitie	Nom commun donné à l'alopecie androgénétique (voir cette fiche : lien vers cette fiche).
Carcinome	Tumeur épithéliale maligne.
Carcinome basocellulaire	Tumeur cutanée fréquente apparaissant surtout sur les zones exposées au soleil (visage, cuir chevelu chauve...) surtout après la cinquantaine.
Carcinome basocellulaire superficiel	Variété de carcinomes basocellulaires à extension très lente sur plusieurs années se présentant comme une plaque rosée très bien limitée.
Carcinome spinocellulaire	Tumeur épithéliale maligne se développant plus rapidement que les carcinomes basocellulaires.
Catagène (Phase)	Phase d'arrêt de croissance du poil ou du cheveu. La phase catagène dure 3 semaines et se traduit par l'arrêt de croissance du cheveu, une miniaturisation de la racine du cheveu (bulbe pileaire) qui diminue de volume et remonte à la surface de la peau. La phase catagène est précédée de la phase anagène et suivie de la phase télogène.
Cellulite disséquante du cuir chevelu	Suppuration profonde du cuir chevelu réalisant des nodules inflammatoires fluctuants et confluents avec disparition des cheveux en surface. Atteint surtout les hommes. Evolution chronique avec des poussées inflammatoires. Le traitement repose sur l'Isotrétinoïne® par voie orale.
Chéloïde	Cicatrice fibreuse intradermique en relief ayant tendance à s'étendre progressivement. Le traitement est difficile : injections de corticoïdes retards, compression prolongée, ablation chirurgicale avec injections de corticoïdes retards répétées pour limiter les récives.
Cheveu	Long poil de couleur variable issu d'un follicule pileux terminal, implanté profondément dans le cuir chevelu. Un cheveu terminal fait au moins 60 µm de diamètre.
Cheveu annelé	Anomalie héréditaire autosomique dominante caractérisée par une alternance de bandes claires et de bandes sombres donnant un aspect brillant à la chevelure. Les zones claires pathologiques correspondent à la présence de bulle d'air dans le cortex.
Cheveu bambou	Voir Trichorrhexie invaginé.
Cheveu cadavérisé	Cheveu télogène cassé ne poussant pas et ressemblant à un point noir. Les cheveux cadavérisés sont observés au cours des pelades aiguës.
Cheveu duvet	Cheveu de moins de 40 µm de diamètre.
Cheveu intermédiaire	Cheveu d'un diamètre compris entre 40 et 60 µm.
Cheveu peladique	Cheveu de quelques mm renflé à son extrémité distale comme un point d'exclamation. Les cheveux peladiques sont observés au cours des pelades évolutives.
Cheveu terminal	Cheveu d'un diamètre supérieur à 60 µm.
Cheveux anagènes caducs (Syndrome des)	Ce syndrome atteint préférentiellement des enfants blonds aux yeux clairs. Les cheveux poussent peu, les enfants ne vont pas chez le coiffeur et les cheveux s'arrachent facilement et sans douleur, sans les gaines épithéliales. Ils repoussent facilement. Il n'y a pas de traitement et les cheveux s'arrachent moins facilement quand les enfants grandissent.
Cheveux incoiffables (Syndrome des)	Anomalie rare de la chevelure caractérisée par un aspect ébouriffé des cheveux rendant la coiffure difficile. Les cheveux sont de section triangulaire avec une gouttière longitudinale. Cette anomalie est isolée et régresse avec l'âge.
Chromhidrose	Coloration anormale de la sueur.
Chromonychie	Coloration anormale de l'ongle et/ou des tissus situés en dessous de l'ongle.
Clouston (Syndrome de)	Syndrome à transmission autosomique dominante associant une atteinte des ongles, une alopecie, une kératodermie palmoplantaire et un déficit intellectuel inconstant. Synonyme : dysplasie ectodermique hidrotique.
Cosmétique	Toutes substances non médicamenteuses destinées à être mises en contact avec les parties superficielles du corps humains (peau, ongles, poil, cheveux...), pour les parfumer, les protéger, les maintenir en bon état ou en modifier l'aspect.
Cosmétologie	Science étudiant la préparation et l'emploi des produits cosmétiques.
« Coup de sabre »	Voir Sclérodermie en coup de sabre.

Couronne séborrhéique	Aspect réalisé par une dermite séborrhéique extensive du cuir chevelu débordant sur le front en avant des cheveux en formant une bordure rouge de 5 à 15 mm de haut.
Cryothérapie	Traitement utilisant le froid sous forme d'azote liquide actuellement. Permet de détruire des lésions cutanées superficielles comme des verrues ou des kératoses actiniques.
Cuticule	Couche externe du cheveu faite de cellules en forme d'écailles se chevauchant les unes sur les autres et protégeant le cheveu des agressions extérieures.
Cutis verticis gyrata	Voir Pachydermie plicaturée du cuir chevelu.
Cycle pileaire	Période d'une durée moyenne de 1 à 6 ans au cours de laquelle, le follicule pileux passe les phases anagènes, catagènes et télogènes. La phase anagène ou phase de pousse dure de 1 à 6 ans. La phase catagène ou phase de régression dure 3 semaines. La phase télogène ou phase de repos puis de chute dure 3 mois. Le cycle pileaire dure en moyenne 2 à 3 ans chez l'homme et 5 à 6 ans chez la femme. Il est raccourci en cas d'alopécie androgénétique.
Cylindrome	Tumeur bénigne issue des glandes sudorales surtout localisée au cuir chevelu, habituellement multiple, d'extension très lente. Les nodules tumoraux sont souvent juxtaposés, confluents et alopeciant. Le traitement est chirurgical. Les récurrences sont habituelles. Synonyme : Tumeur en turban.
Demodex folliculorum	Acarien saprophyte des follicules pileux occasionnellement pathogène au cours de la rosacée ou de certaines folliculites.
Dépilatoire	Produit chimique réalisant une épilation temporaire par destruction des poils : acide thioglycolique et dérivés. Ces produits sont irritants en cas d'application trop prolongée.
Dermatophyte	Champignon infectant la peau ou les cheveux. Trois genres sont écrits : - <i>Epidermophyton</i> - <i>Microsporum</i> - <i>Trichophyton</i>
Dermatophytose	Infection cutanée de la peau, des ongles, des cheveux ou des poils secondaire à des dermatophytes. Synonyme : Dermaphytie.
Dermatose pustuleuse érosive du cuir chevelu	Voir Pustulose érosive du cuir chevelu.
Derme	Partie de la peau située entre l'épiderme en surface et l'hypoderme en profondeur contient les fibres collagènes, les fibres élastiques, les vaisseaux, les terminaisons nerveuses.
Dermite séborrhéique	Infection cutanée très fréquente, localisée au cuir chevelu ou aux zones médio-faciales caractérisées par des plaques rouges recouvertes de squames jaunâtres au niveau du visage et de pellicules au niveau du cuir chevelu. L'évolution est chronique et récidivante (voir cette fiche : lien vers cette fiche).
Dermocorticoïde	Anti-inflammatoire, dérivé stéroïdien, sous formes de lotion, gel, crème, mousse, pommade ou shampooing, destiné à être appliqué sur la peau ou sur le cuir chevelu.
Desquamation	Elimination spontanée des cellules superficielles de la peau ou du cuir chevelu sous forme de squames plus ou moins grosses selon les maladies de la peau ou du cuir chevelu qui en sont responsables.
Duvet	Cheveu très fin, court, peu pigmenté de moins de 40 µm de diamètre. Synonyme : Cheveu duvet.
Dysplasie ectodermique	Maladie caractérisée par des atteintes pouvant toucher les cheveux, les dents, les ongles, les glandes sudorales et des anomalies du squelette.
Dysplasie ectodermique anhidrotique	Syndrome associant une disparition ou une diminution de la transpiration, une alopecie, une absence totale ou partielle des dents et une dysmorphie faciale. Syndrome transmis sur un mode récessif lié aux chromosomes X.
Dysplasie ectodermique hidrotique	Voir Clouston (Syndrome de)
Dysplasie pileaire	Anomalie de forme ou de structure de la tige pileaire, d'origine héréditaire. Une dysplasie pileaire peut être alopeciante ou non alopeciante.
Ectoparasite	Parasite vivant à la surface de la peau ou dans les cheveux tels que : pus, pou, punaise, morpion...
Effluvium	Chute des cheveux ou des poils anormale et excessive. Une chute de cheveux supérieure à 100 cheveux/j est excessive et traduit un effluvium.
Effluvium anagène	Chute de cheveux brutale et importante de cheveux en phase anagène. Les causes principales sont les suivantes : - Médicaments anti-mitotiques (chimiothérapies),

	<ul style="list-style-type: none"> - Toxiques, - Irradiation...
Effluvium télogène	<p>Chute de cheveux en phase télogène excessive et pathologique, aiguë ou chronique. Les étiologies d'un effluvium télogène aigu sont multiples :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fièvre élevée et prolongée, - Anémie aiguë, - Intervention chirurgicale prolongée - Amaigrissement rapide, - Suite d'un accouchement.
Épilation	<p>Destruction contrôlée, temporaire ou définitive de la pilosité. L'épilation peut se faire par des méthodes classiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pince à épiler, rasage, épilation à la cire, épilation traditionnelle orientale. <p>L'épilation chimique se fait avec des crèmes dépilatoires qui détruisent les poils et doivent être soigneusement rincés. L'épilation électrique est un geste médical.</p>
Épilation électrique	<p>Geste médical qui permet de détruire les cellules de la racine du poil, ce qui permet une épilation définitive. Une très fine aiguille est enfoncée jusqu'à la racine en suivant le trajet du poil puis un courant électrique de faible intensité permet de détruire la racine. Une répétition des séances est toujours nécessaire car dans certains cas, une repousse plus fine est possible et surtout les poils ne sont pas tous en phase de croissance en même temps.</p>
Erosion	<p>Petite plaie très superficielle avec disparition de l'épiderme et du derme très superficiel. Une érosion cicatrice facilement et sans séquelles. Synonyme : Exulcération</p>
Erythème	<p>Rougeur de la peau qui s'efface à la pression. L'érythème traduit une inflammation.</p>
Erythrodermie	<p>Rougeur généralisée de la peau. Peut traduire une maladie inflammatoire ou tumorale ou une allergie médicamenteuse.</p>
Erythrose	<p>Rougeur diffuse atteignant le visage évoluant par poussées souvent déclenchée par les émotions, les variations de températures, l'alcool ou les repas abondants.</p>
Eumélanine	<p>L'eumélanine est un pigment. Il s'agit de la mélanine habituelle, responsable de la pigmentation foncée de la peau et des cheveux. L'eumélanine est différente de la phéomélanine des sujets roux.</p>
Excipient	<p>Partie inactive d'un produit appliqué localement dans lequel est dilué le principe actif. Selon la nature des excipients, le produit actif sera dilué dans une crème, une pommade, une mousse, une lotion...</p>
Excoriation	<p>Petite ulcération cutanée superficielle d'origine traumatique souvent produite par le grattage.</p>
Exfoliation	<p>Élimination des couches superficielles de l'épiderme soit par une crème exfoliatrice, soit par un gommage. L'exfoliation s'oppose à l'élimination spontanée des couches superficielles de l'épiderme appelée la desquamation.</p>
Exothrix	<p>Qui se trouve à l'extérieur du poil ou du cheveu.</p>
Exulcération	<p>Voir Erosion</p>
Fausse teigne amiantacée	<p>Plaque unique ou plaques multiples de squames très bien limitées siégeant au niveau du cuir chevelu. Les squames sont épaisses et blanchâtres, elles recouvrent les cheveux et les plaques le long du cuir chevelu. Les fausses teignes amiantacées sont parfois responsables d'une alopecie localisée au niveau des plaques et réversibles après traitement. On peut observer des fausses teignes amiantacées au cours d'infection localisée du cuir chevelu, au cours de la dermite séborrhéique sévère du cuir chevelu, au cours d'eczéma localisé, de psoriasis ou encore de lichen plan ou de folliculite décalvante de Quinquaud.</p>
Favus	<p>Infection localisée du cuir chevelu par un champignon : <i>Trichophyton schoenleinii</i>, observée surtout sur le pourtour du bassin méditerranéen et caractérisée par des plaques croûteuses reposant sur un cuir chevelu déprimé et responsable d'une chute localisée des cheveux. L'évolution se fait vers une alopecie cicatricielle. Le Favus atteint plus facilement les enfants. S'il est non traité, il peut persister indéfiniment. Le traitement utilise des médicaments antimycosiques utilisés localement et en comprimés (voir fiche teigne : lien vers cette fiche)</p>
Fibroblaste	<p>Cellule allongée présente au niveau du derme et autour des follicules pileux, responsable de la synthèse des fibres de collagènes et des fibres élastiques du derme. Les fibroblastes interviennent dans les phénomènes de cicatrisation ou dans les phénomènes de fibroses.</p>
Flore cutanée	<p>Ensemble des microbes présents normalement à la surface de la peau et au niveau des orifices des poils, des cheveux, et des glandes sébacées. Les principaux microbes retrouvés sont les <i>staphylocoques blancs</i>, les <i>microcoques</i>, les <i>corynébactéries</i>, les <i>Candidas non albicans</i> et <i>Malassezia furfur</i>.</p>

Follicule pileux ou follicule pilo-sébacé	<p>Structure anatomique responsable de la pousse du poil ou du cheveu. Il est séparé en 3 parties :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un tiers profond, appelé bulbe où est fabriqué le poil - Un tiers moyen, appelé isthme - Un tiers supérieur, appelé infundibulum <p>La glande sébacée qui entoure le poil sécrète du sébum et s'abouche à la jonction de l'infundibulum et de l'isthme.</p>
Folliculite	Inflammation du follicule pileux (poil ou cheveu), le plus souvent d'origine infectieuse
Folliculite décalvante de Quinquaud	<p>Synonyme : folliculitis decalvans, folliculitis depilans, folliculite épilante de Quinquaud</p> <p>Alopécie cicatricielle du cuir chevelu en plaques confluentes avec en périphérie des pustules folliculaires remplacées progressivement par une fibrose cicatricielle. Il existe à la périphérie, un regroupement des cheveux en touffe. La folliculite décalvante touche essentiellement le cuir chevelu mais peut également toucher les autres zones pileuses du corps.</p>
Folliculite disséquante du cuir chevelu	<p>Synonyme : péri-folliculitis capitis abscedens et suffodiens de Hoffmann, cellulite disséquante du cuir chevelu.</p> <p>Aspect profond du cuir chevelu fait de nodules inflammatoires et alopeciant, fluctuants et confluent. Les abcès peuvent fistuliser à la peau et se dégonfler.</p> <p>L'évolution est chronique avec des poussées évolutives, des périodes de rémission et des récidives. Atteint surtout les hommes et plus souvent les patients d'origine africaine ou du pourtour du bassin méditerranéen. Le traitement repose essentiellement sur l'Isotrétinoïne® (voir fiche : lien vers cette fiche).</p>
Folliculite fibrosante de la nuque	<p>Folliculite inflammatoire de la nuque, chronique, favorisée par le rasage et évoluant vers des cicatrices fibreuses éventuellement chéloïdes. Il existe un facteur génétique. Le traitement repose sur des antibiotiques de la famille des cyclines, associés à des corticoïdes locaux, éventuellement sous forme d'injections. Il faut arrêter totalement le rasage et conseiller une coupe avec une tondeuse et un sabot de 4 à 5 mm.</p>
Folliculite sous naevique	<p>Folliculite responsable d'une inflammation d'un grain de beauté traversé par des poils. Le grain de beauté augmente de volume, devient légèrement rouge, douloureux et sensible lorsqu'on le touche. Cette folliculite régresse avec un traitement antiseptique local. L'évolution est toujours bénigne. En cas de récurrence, le meilleur traitement consiste à retirer le grain de beauté chirurgicalement.</p>
Folliculite trichophytique	<p>Folliculite secondaire à un champignon du genre trichophyton souvent responsable de teigne. Cette folliculite peut intéresser le visage mais également le corps au niveau des zones de frottement ou des zones de rasage.</p>
Furoncle	<p>Folliculite profonde avec destruction du poil et du follicule pilo-sébacé secondaire à un staphylocoque doré.</p> <p>Les furoncles siègent le plus souvent dans les zones de frottement et commencent par un nodule inflammatoire douloureux. Le traitement est essentiellement local et un traitement général n'est indiqué qu'en cas de fièvre, de complication ou en cas de localisation dangereuse dans la zone centrale du visage.</p>
Furunculose	Répétition et récurrence de furoncles multiples.
Gaine coulissante péripilaire	<p>Petit manchon blanchâtre de kératine qui entoure la base des cheveux et coulisse le long des cheveux.</p> <p>Les gaines coulissantes péripilaires ne doivent pas être confondues avec les lentes ou les pellicules banales.</p> <p>On peut les retrouver lors de certaines dermatoses inflammatoires du cuir chevelu. Elles sont parfois induites par des tractions chroniques comme des couettes, des nattes, des chignons serrés...</p>
Gaine épithéliale externe	<p>Couche de cellules épithéliales formant la gaine la plus périphérique du follicule pileux.</p> <p>La gaine épithéliale externe est en continuité avec l'épiderme de la surface de la peau pour les poils, et de la surface du cuir chevelu pour les cheveux.</p>
Gaine épithéliale interne	<p>Gaine épithéliale comprise entre le poil ou le cheveu en dedans et la gaine épithéliale externe en dehors. Cette gaine prend naissance au niveau du bulbe, partie profonde de la racine du cheveu et participe à la fabrication du cheveu.</p>
Génodermatose	Maladie cutanée d'origine génétique.
Glande apocrine	<p>Glande sudorale située dans les régions axillaires et ano-génitale et se développant après la puberté. Les glandes apocrines s'abouchent à l'intérieur des follicules pilo-sébacés.</p>
Glande eccrine	<p>Glande sudorale présente sur l'ensemble de la peau et au niveau du cuir chevelu, sécrétant une sueur claire. Les glandes eccrines s'abouchent directement à la peau ou sur le cuir chevelu.</p>
Glande sébacée	<p>Glande annexée à un poil ou à un cheveu et sécrétant du sébum. Les glandes sébacées s'abouchent directement dans les follicules pilo-sébacés au niveau de l'infundibulum. Avec le follicule pileux, elle constitue le follicule pilo-sébacé.</p>
Glande sudorale	<p>Glande sécrétant la sueur. On distingue les glandes sudorales eccrines et les glandes sudorales apocrines.</p>
Godet favique	<p>Lésion caractéristique du favus ou de la teigne. C'est une dépression du cuir chevelu en forme de cupule centrée par un cheveu et remplie de croûtes jaunâtres faites de filaments de</p>

	champignon du type <i>Trichophyton schoenleinii</i> .
Golfe temporal	Zone sans cheveux située en arrière du front des 2 côtés à droite et à gauche. Les golfes temporaux apparaissent normalement chez les garçons après la puberté. Quand il se développe trop, il faut suspecter un début d'alopecie androgénétique.
Grain de beauté	Synonyme de nævus.
Greffe de cheveux	Technique chirurgicale qui consiste à transposer des petits fragments de cuir chevelu prélevés sur les deux zones donneuses occipitales contenant des cheveux normaux et transférés sur une zone donneuse chauve. (voir fiche : lien vers cette fiche).
Greffon cylindrique	Greffon de cuir chevelu de 3 à 4 mm de diamètre prélevé avec des punches (bistouri circulaire) sur une zone chevelue pour être inséré sur une zone non chevelue. (voir fiche Greffe de cheveux : lien vers cette fiche).
Hamartome	Malformation cutanée limitée le plus souvent présente dès la naissance et secondaire à un développement excessif ou anormal de certaines composantes de la peau.
Hamartome sébacé	Plaque jaunâtre, lisse, très limitée, secondaire à un développement localisé, excessif, de glandes sébacées. A l'âge adulte, cette lésion peut se compliquer de tumeur bénigne qui doit être opérée. Les hamartomes sébacés sont habituellement opérés pour supprimer cette lésion inesthétique et éviter les complications.
Hamartome verruco-sébacé	Hamartome sébacé associé à un développement excessif de l'épithélium de surface, responsable d'un aspect épais, grisâtre, crouteux. A l'âge adulte, l'hamartome verruco-sébacé peut se compliquer de lésion tumorale, le plus souvent bénigne. L'ablation chirurgicale est recommandée sans urgence.
Hidrosadénite	Infection chronique des glandes sudoripares apocrines et des follicules pileux au niveau des régions axillaires et ano-génitales. Des abcès douloureux et profonds peuvent se vider en surface par intermittence ou se résorber lentement. La maladie évolue par poussées. Synonyme : Maladie de Verneuil.
Hirsutisme	Développement excessif d'une pilosité sur les zones hormono-dépendantes chez la femme : <ul style="list-style-type: none"> - Moustache - Menton - Favoris - Seins - Abdomen L'hirsutisme est parfois isolé mais il doit faire rechercher une sécrétion d'hormones masculines excessive. Une consultation médicale et un bilan sont donc nécessaires.
Hoffmann	Dermatologue allemand ayant donné son nom à la folliculite disséquante du cuir chevelu (lien vers voir ce thème).
Horton	Médecin américain ayant donné son nom à la maladie de Horton ou artérite temporale.
Hydroquinone	Substance chimique dérivée des hydrocarbures qui permet, utilisée en crème, de diminuer les pigmentations cutanées excessives.
Hyperplasie angio-lymphoïde avec éosinophilie	Maladie rare caractérisée par des boutons en relief ou sous la peau, souvent multiples au niveau des oreilles, autour des oreilles sur le cuir chevelu et sur les côtés du cou, survenant souvent chez des adultes jeunes et pouvant s'accompagner d'une augmentation dans le sang des polynucléaires éosinophiles.
Hyperplasie sébacée	Petite lésion très fréquente chez les adultes, siégeant habituellement au front, au visage sous forme de petits boutons blancs ou blanc-jaunâtres, légèrement en relief et contenant des glandes sébacées.
Hyperséborrhée	Production excessive de sébum par les glandes sébacées rendant la peau grasse. Synonyme : Hyperséborée.
Hypertrichose	Développement excessif des poils sur toutes les zones du corps. A différencier de l'hirsutisme qui ne touche que les zones dépendantes des hormones.
Hypertrichose névoïde	Zone de poils anormaux car trop denses ou trop pigmentés correspondant à un « grain de beauté » avec un développement excessif des racines des cheveux ou de poils.
Hypoderme	Partie de la peau située sous le derme, constituée par des lobules graisseux et des vaisseaux. On trouve également dans l'hypoderme, les glandes sudoripares et la racine des follicules pileux formant les poils ou les cheveux.
Hypodermite	Inflammation de l'hypoderme.
Hypohidrose	Diminution des sécrétions sudorales eccrines c'est-à-dire diminution de la transpiration. (voir aussi anhidrose : voir cette fiche).
Hypomélanose	Diminution de la pigmentation de la peau en rapport avec une baisse des pigments mélaniques.
Hypomélanose idiopathique en goutte	Apparition de petites taches blanches de quelques millimètres surtout sur les jambes et les avant-bras chez les adultes s'étant beaucoup exposés au soleil.
Hypopigmentation	Diminution de la teneur en pigment et donc diminution de la coloration.

Hypotrichose	Insuffisance de développement des poils et des cheveux.
Hypotrichose congénitale simple	Insuffisance de développement des cheveux se traduisant dès la naissance par des cheveux fins et peu nombreux sans aucune autre anomalie.
Hypotrichose héréditaire de Marie Unna	Maladie génétique autosomique dominante caractérisée par une hypotrichose à la naissance, des cheveux épais et tortueux, associée progressivement, à partir de la puberté, à des plaques d'alopecie cicatricielle.
Ichtyose	Maladies au cours desquelles, l'épiderme de la peau se renouvelle trop vite avec une desquamation continue donnant à la peau un aspect sec et craquelé avec des squames de taille variable.
Immunofluorescence cutanée directe	Technique d'examen au microscope qui permet, à partir d'une biopsie cutanée, de localiser par fluorescence des anticorps fixés sur la peau. La biopsie doit être transportée soit congelée dans de l'azote liquide soit dans un liquide de transport spécial, dit liquide de Michel.
Immunofluorescence cutanée indirecte	Technique qui permet de retrouver des anticorps dirigés contre la peau et circulant dans le sang.
Infundibulum pileaire	Tiers superficiel du follicule pileux compris entre la surface de la peau et l'abouchement de la glande sébacé.
Injection intralésionnelle	Technique intralésionnelle qui consiste à injecter directement dans la lésion, la substance active de manière à obtenir un taux élevé dans la lésion en ayant très peu d'action générale. Des toutes petites injections de corticoïdes retardés répétées tous les 5 à 8 mm peuvent permettre de traiter ainsi des cicatrices chéloïdes, des plaques de pelade, ou des alopecies inflammatoires.
Isthme pileaire	Tiers moyen du follicule pileux compris entre l'infundibulum en surface et le bulbe en profondeur. L'isthme pileaire est limité par l'abouchement de la glande sébacée en surface et l'insertion du muscle pilo-arrecteur en profondeur.
Jadassohn (naevus sébacé de)	Voir hamartome sébacé.
Kératine	Protéine contenant des acides aminés soufrés, fabriquée par les cellules épithéliales de la peau et des poils et des cheveux. Il existe une trentaine de kératines différentes qui entrent dans la composition de la surface de la peau, des poils, des cheveux et des ongles.
Kératinisation	Processus de fabrication de la kératine par les cellules épidermiques donnant naissance aux cellules cornées superficielles de la peau, aux poils, aux ongles et aux cheveux.
Kératinocyte	Cellule de l'épiderme contenant des filaments de kératine.
Kératodermie	Epaississement de la couche cornée superficielle de la peau, riche en kératine.
Kératolytique	Se dit d'une substance qui dissout la kératine et permet de faire peler les couches superficielles de la peau et d'éliminer les pellicules au niveau du cuir chevelu. Les produits les plus utilisés sont l'acide salicylique, les acides de fruits dont l'acide glycolique et l'urée.
Kératose	Epaississement localisé de la couche cornée superficielle de la peau.
Kératose actinique	Epaississement localisé de la couche cornée de l'épiderme blanchâtre ou grisâtre, dur, fixe et ne guérissant pas spontanément. Ces lésions apparaissent essentiellement sur le visage, le cuir chevelu et le dos des mains mais plus généralement sur des zones qui ont été très exposées au soleil chez des adultes après la cinquantaine. Synonyme : kératose sénile ou kératose solaire. La couche superficielle, dure et kératosique, se détache difficilement et la lésion persiste et se redéveloppe indéfiniment au même endroit. En l'absence de traitement, les kératoses actiniques peuvent parfois évoluer vers un carcinome spinocellulaire. Le traitement peut être chirurgical mais les kératoses actiniques peuvent également être traitées par la cryothérapie à l'azote liquide, la photothérapie dynamique, ou des traitements locaux médicamenteux. Synonyme : Kératose sénile, kératose solaire.
Kératose folliculaire	Voir Synonyme : kératose pileaire.
Kératose pileaire	Aspect râpeux de la peau prédominant aux phases d'extension des bras et des cuisses, secondaire à des petites élevures kératosiques qui entourent les orifices des poils qui ont des difficultés à sortir. La kératose pileaire simple est familiale à transmission autosomique dominante. Elle est très fréquente dans la population.
Kératose pileaire rouge atrophiante	Kératose pileaire discrète des joues et des régions en avant des oreilles, se développant sur une peau qui est rouge et évoluant vers une atrophie de la peau et une disparition des poils. Les sourcils sont également rouges et peu fournis. La transmission génétique est autosomique dominante.
Kératose séborrhéique ou séboréique	Lésion cutanée bénigne, très fréquente surtout observée après 50 ans, se présentant comme des tâches rondes ou ovalaires, très limitées comme posées sur la peau, jaunâtres, brunes, parfois

	<p>foncées. La surface est irrégulière, mamelonnée comme un chou-fleur et peu peler et se renouveler. Les verrues séborrhéiques très pigmentées peuvent ressembler à tort à un mélanome. Synonyme : Verrue séborrhéique ou séboréique.</p>
Kératose sénile	Confère kératose actinique.
Kératose solaire	Confère kératose actinique.
Keratitis follicularis spinulosa decalvans de Siemens	Maladie dermatologique héréditaire qui associe une kératose folliculaire disséminée atteignant le cuir chevelu, les sourcils et le corps, associée à une disparition progressive des cils et des sourcils, à une alopécie cicatricielle, à une conjonctivite et à une inflammation de la cornée de l'œil. Cette maladie est à transmission génétique récessive liée au chromosome X.
Kérion de Celse	<p>Infection inflammatoire du cuir chevelu, de la barbe ou parfois de la peau, secondaire à un champignon. Les lésions sont arrondies, en relief, avec disparition des poils ou des cheveux remplacés par des pustules. Les lésions peuvent suinter et devenir croûteuses. Elles sont habituellement peu nombreuses. Une, deux ou trois lésions...</p> <p>Les champignons responsables sont transmis par des animaux avec des poils : chevaux, bovins, souris, rats, cobails...</p> <p>Synonyme : teigne suppurative, teigne inflammatoire.</p>
KID Syndrome	<p>Maladie dermatologique héréditaire associant une kératose prédominant au niveau des mains et des pieds, une inflammation de la cornée de l'œil ou kératite et une surdité. KID veut dire Keratitis, Ichthyosis, Deafness (Kératite, Ichtyose, Surdité).</p>
Koïlonychie	<p>Anomalie de la forme des ongles qui sont déprimés en leur centre et relevés sur les côtés et sur le bord libre leur donnant un aspect en cuillère ou en cuillère. Synonyme : Ongles en cuillère.</p>
Kyste épidermique	<p>Kyste cutané très bien délimité par une poche reproduisant la structure de l'épiderme cutanée. L'intérieur du kyste est rempli de kératine. Ils sont bénins et le traitement est chirurgical si les patients sont gênés. Synonyme : Kyste cutané, kyste épidermoïde.</p>
Kyste folliculaire	Voir kyste trichilemmal.
Kyste pilonidal	<p>Kyste d'origine embryonnaire situé au niveau du sommet du sillon des fesses, en arrière d'une petite dépression, appelée la fossette coccygienne. Ces kystes peuvent contenir des poils, de la kératine, se surinfecter et vider leur pus en s'ouvrant à la peau. Le traitement est chirurgical.</p>
Kyste sébacé	<p>Kyste contenant du sébum, de consistance molle, blanchâtre ou jaunâtre, malodorant. Les kystes sébacés siègent au niveau des régions séborrhéiques c'est-à-dire le visage, le cou et le dos. Leur traitement est chirurgical.</p>
Kyste trichilemmal	<p>Kystes souvent familiaux et multiples transmis sur un mode autosomique dominant. Ils apparaissent à l'âge adulte et siègent essentiellement au niveau du cuir chevelu sous la forme de petites tumeurs rondes, fermes, facilement mobilisables sous le cuir chevelu. Le traitement est chirurgical. Synonyme : Loupes.</p>
Lame unguéale	<p>Il s'agit de l'ongle lui-même comprenant la racine cachée sous la peau, la lunule (petite partie blanchâtre en demi-lune à la base de l'ongle), l'ongle lui-même et la partie distale ou bord libre. Synonyme : ongles, tablette unguéale.</p>
Lanugo	Poils fins et courts comme du duvet apparaissant chez le fœtus vers la 28 ^{ème} semaine de vie et disparaissant en fin de grossesse progressivement pour disparaître totalement vers le 4 ^{ème} mois après la naissance.
Lassueur-Graham-Little (Syndrome de)	<p>Syndrome associant une alopécie cicatricielle à type de pseudo-pelade du cuir chevelu avec une disparition associée des sourcils, des poils axillaires, des poils pubiens et parfois des poils des membres. Synonyme : Syndrome de Graham Little, Syndrome de Piccardi-Lassueur-Graham-Little.</p>
Leuconychie	Coloration blanche des ongles soit sous forme de petites tâches uniques ou multiples, soit sous forme diffuse.
Lichen plan pilaire	<p>Maladie inflammatoire détruisant les poils et les cheveux se développant au niveau du cuir chevelu sous forme de petites plaques d'alopécie cicatricielle, d'extension centrifuge avec souvent persistance de quelques cheveux au sein des plaques. Synonyme : Lichen folliculaire, lichen pilaire.</p>
Lipome	<p>Tumeur graisseuse bénigne, très bien limitée, le plus souvent ronde ou polylobée, bien mobile sous la peau. Le traitement n'est pas nécessaire mais si la tumeur est inesthétique ou douloureuse, le traitement est chirurgical.</p>
Loupe du cuir chevelu	Voir kyste trichilemmal.
Ludwig (Classification de)	<p>Classification des alopecies androgénogénétiques féminines en 3 stades :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ (peu sévère) 2/ modéré

	3/ sévère Cette classification est utilisée depuis 1977.
Lupus érythémateux	Maladie auto-immune de cause inconnue au cours de laquelle, l'organisme développe des anticorps contre les noyaux et contre l'ADN des cellules. Il existe une forme diffuse ou lupus érythémateux systémique qui peut toucher l'ensemble des organes en particulier la peau mais également les reins, le système nerveux et d'autres organes. Il existe une forme chronique qui ne touche que la peau et le cuir chevelu et qui est de bon pronostic.
Lupus érythémateux chronique	Forme purement cutanée de lupus érythémateux. Les atteintes dominent au niveau du visage, au niveau du cuir chevelu et au niveau des oreilles. Il s'agit de plaques érythémateuses (rouges), très limitées et recouvertes de squames plus ou moins blanchâtres. Les sujets atteints sont très souvent sensibles au soleil et les expositions solaires peuvent déclencher des poussées de la maladie.
Macule	Lésion dermatologique de base consistant en une tache cutanée, plate, sans relief, sans infiltration. Une macule peut être achromique ou hypochromique (blanche ou claire), hyperpigmentée (brune ou noire) ou érythémateuse (rouge ou rosée).
Maladie de Horton	Inflammation des artères prédominant sur les artères de la tête et du cou et surtout sur l'artère temporale. Se manifeste habituellement par une fièvre, un amaigrissement, une transpiration la nuit et des céphalées (maux de tête). Le principal risque est de devenir aveugle par une atteinte des artères ophtalmiques. Des douleurs du cuir chevelu et une nécrose partielle du cuir chevelu sont possibles en cas d'atteinte sévère.
<i>Malassezia furfur</i>	Champignon ou levure lipophile (c'est-à-dire aimant la peau grasse) qui peut se développer et être responsable de pityriasis versicolore (voir ce terme). Synonyme : <i>Pityrosporum orbiculare</i> .
Marie Unna (Hypotrichose héréditaire de)	Voir Hypotrichose héréditaire de Marie Unna.
Matrice pileaire	Portion inférieure du bulbe pileaire ou de la racine du cheveu, responsable de la formation des poils ou des cheveux. Il existe au niveau de la matrice pileaire, de très nombreuses multiplications cellulaires (mitose) qui permettent de synthétiser et de faire pousser le poil ou le cheveu.
Matrice unguéale	Racine de l'ongle où siège de nombreuses multiplications cellulaires (mitose) qui permettent la synthèse et la pousse des ongles.
Médullaire du poil ou du cheveu	Zone centrale du poil ou du cheveu constituée de cellules peu jointives, souvent remplacées par des petites bulles d'air surtout sur des cheveux de fort calibre. La médullaire n'existe pas dans les poils fins, les duvets du cuir chevelu et le lanugo.
Mélanine	Pigment foncé synthétisé par les mélanocytes (voir ce terme), responsable de la couleur de la peau et des cheveux.
Mélanocytes	Cellules synthétisant la mélanine et retrouvées dans la couche basale de l'épiderme au niveau de la peau et dans la matrice pileaire (voir ce terme) au niveau des racines des poils et des cheveux.
Mélanodermie	Couleur foncée de la peau, brunâtre ou noirâtre, secondaire à la présence de mélanine.
Mélanome	Cancer de la peau développé à partir des mélanocytes soit à partir des mélanocytes épidermiques responsables de la pigmentation normale, soit à partir d'un grain de beauté préexistant. Synonyme : Mélanome malin.
Menkes (Syndrome de)	Maladie dermatologique cutanée à transmission récessive liée au sexe et atteignant les garçons (le gène est sur le chromosome X). Un déficit génétique de l'absorption digestive du cuivre est responsable d'infection, d'une encéphalopathie sévère et d'anomalie des cheveux. Les cheveux sont normaux à la naissance mais deviennent en quelques semaines dépigmentés, fins, secs, cassants, avec au microscope des images de pili torti très évocatrices et parfois des aspects de pseudo monilethrix et de trichorrhexie noueuse.
Microgreffe	Fragment de cuir chevelu contenant une unité folliculaire avec 1, 2 ou 3 cheveux, utilisé pour la transplantation capillaire (voir fiche : lien vers greffe de cheveux).
Mini greffe	Très petit fragment de cuir chevelu contenant 4 à 6 cheveux.
Minoxidil	Molécule utilisée en application locale biquotidienne à la concentration de 2% dans le traitement des alopecies androgénétiques masculines ou féminines et à la concentration de 5% dans le traitement de l'alopecie androgénétique masculine.
Monilethrix	Maladie cutanée génétique à transmission autosomique dominante associant une kératose folliculaire et des cheveux très caractéristiques alternant des zones étroites et des zones larges avec fracture des cheveux sur les zones étroites. L'alopecie qui en résulte est variable selon les cas mais s'aggrave habituellement avec l'âge. (voir cette fiche : lien vers cette fiche).
Morpion	Parasite des zones pileuses génitales transmis par contact pouvant également atteindre les cils ou plus rarement les sourcils. Synonyme : Pou du pubis ou phtirus pubis.
Mucine	Mycopolysaccharide acide normalement sécrétée en petites quantités par les fibroblastes et en quantité excessive au cours des mucinoses.

Mucinose	Maladie de la peau (mucinose dermique) ou des cheveux et des poils (mucinose folliculaire) caractérisée par l'accumulation de mucine en excès dans la peau. La mucine est colorée en bleu par le bleu Alcian.
Mucinose folliculaire	Accumulation de mucine dans les follicules pileux, responsable de papules folliculaires confluentes avec disparition des poils, des sourcils ou des cheveux, selon les zones atteintes. La mucinose folliculaire peut être isolée ou parfois associée à un lymphome cutané.
Muscle pilo arrecteur	Petit muscle annexé aux follicules pileux, sur lequel il s'insère. Il permet le redressement des poils.
Mycose cutanée	Infection cutanée provoquée par un champignon.
Naevus	Tumeur cutanée bénigne, pigmentée ou non pigmentée, plate ou en relief, secondaire au développement de mélanocytes. Synonyme : Grain de beauté.
Naevus bleu	Naevus bénin. La couleur bleue est secondaire à sa localisation profonde au niveau de l'hypoderme (graisse de la peau).
Naevus sébacé	Voir Hamartome sébacé de Jadassohn.
Naevus verruco-sébacé	Voir Hamartome verruco-sébacé.
Naevus verruqueux	Voir Hamartome verruco-sébacé.
Netherton (Syndrome de)	Maladie héréditaire de la peau, autosomique récessive, associant une ichtyose et une dysplasie pileaire avec des images de trichorrhexie invaginée et de trichorrhexie noueuse au niveau des cheveux et des cils et des sourcils. Les cheveux sont secs, cassants, courts et fragiles. Il faut éviter les traitements agressifs et coiffer les cheveux avec douceur pour éviter qu'il ne casse.
Névrodermite	Epaississement de la peau ou du cuir chevelu responsable de démangeaisons importantes et secondaires à des manœuvres de grattage ou de frottement répétés. Synonyme : Lichénification.
Ongle grésé	Ongle rugueux et terne avec des striations irrégulières, longitudinales comme décapé par un jet de sable. Des ongles grésés peuvent être observés au cours des pelades ou du psoriasis.
Onycholyse	Décollement de l'ongle.
Onychomadèse	Décollement de l'ongle à partir de sa racine.
Onychomycose	Infection de l'ongle par un champignon.
Onychophagie	Fait de se ronger régulièrement les ongles.
Onychotillomanie	Tic consistant à se manipuler les ongles.
Onyxis	Inflammation de l'ongle le plus souvent due à un champignon.
Pachydermie onychie	Epaississement d'un ou de plusieurs ongles. Parfois congénitale et le plus souvent secondaire à un psoriasis ou à une onychomycose.
Pachydermie plicaturée du cuir chevelu	Epaississement de la peau et du cuir chevelu qui devient plissé avec des sillons profonds parfois malodorants. Synonyme : Pachydermie vorticellée du cuir chevelu, <i>cutis verticis gyrata</i> .
Papille pileaire	Tissu conjonctif situé au centre du bulbe pileaire contenant des fibroblastes, des nerfs et des vaisseaux et contrôlant la pousse des poils ou des cheveux.
Papule	Lésion cutanée et élémentaire en discret relief ou discrètement infiltrée pouvant être pigmentée, rouge, claire ou de couleur de peau normale.
Pathonymie	Dermatose auto-provoquée par un sujet de façon inconsciente ou volontaire.
Pityriasis versicolore	Mycose cutanée bénigne non contagieuse, se traduisant par des plaques rosées ou bruns clairs (couleur chamois), très bien limitées se développant au niveau du cou, des épaules, du décolleté et de la zone du milieu du dos. Cette infection est due au développement de levures lipophiles du genre <i>Malassezia</i> (voir ce terme).
Punch	Petit bistouri circulaire permettant de prélever une carotte de peau pour une biopsie (voir cette fiche : lien vers cette fiche).
Pustulose érosive du cuir chevelu	Dermatose inflammatoire du cuir chevelu non infectieuse survenant surtout chez les sujets âgés sous forme de plaques rouges avec des micro-pustules superficielles, des croûtes et un cuir chevelu ulcéré et alopecique. Cette affection est favorisée par les expositions solaires, les Ultra-violets, la chirurgie, la cryothérapie et tous les traitements locaux agressifs.
Parasitophobie	Phobie des maladies parasitaires cutanées : pédiculose, gale...
Peau	La peau est un organe souple et résistant qui recouvre la surface du corps et dont la couleur varie selon les races. La peau est composée de 3 couches : <ul style="list-style-type: none"> - L'épiderme en surface - Le derme juste en dessous - L'hypoderme en profondeur
Pédiculose	Infestation par les poux qui peuvent être de 3 variétés :

	<ul style="list-style-type: none"> - Poux de tête - Poux du corps - Poux du pubis Synonyme : Phtiriase.
<i>Pediculus humanus capitis</i>	Variété de poux vivant à la surface du cuir chevelu. Il pond des œufs appelés lentes, fixés à la base des cheveux qui éclosent en 10 jours. La taille d'un parasite adulte est d'environ 2 mm et ils peuvent passer d'une chevelure à l'autre par contact direct ou par échange de bonnet. Ils sont responsables de petites épidémies surtout dans les écoles. Synonyme : Poux de tête.
Pelade	Variété d'alopécie non cicatricielle, le plus souvent en plaques de taille variable, pouvant siéger sur la barbe, le cuir chevelu mais aussi les cils, les sourcils, et tous les poils du corps (voir fiche pelade : lien vers cette fiche). Synonyme : Alopecia areata.
Peladiques (cheveux)	Voir cheveux peladiques. Synonyme : cheveux en points d'exclamation.
Pellicules	Squames blanchâtres constitués d'un amas de cellules épidermiques se détachant de la surface du cuir chevelu et pouvant se répandre dans les cheveux et sur les vêtements. On distingue les pellicules sèches et les pellicules grasses. En cas d'irritations ou de rougeurs, il faudra évoquer une dermite séborrhéique (voir fiche dermite séborrhéique : lien vers cette fiche).
Péri-folliculite	Inflammation cutanée entourant un follicule pileux.
Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens d'Hoffmann	Voir folliculite disséquante du cuir chevelu.
Peri onyxis	Inflammation de la base et du pourtour des ongles pouvant être purulente ou non. Synonyme : Paronychie.
Permanente	Technique de coiffure qui permet de faire friser ou de faire onduler les cheveux de façon durable. Les permanentes répétées ou excessives induisent une sécheresse des cheveux, un décollement des écailles les rendant rêches, des cassures et des extrémités fourchues. Des allergies cutanées aux produits utilisés sont possibles.
Phéomélanine	Mélanine riche en soufre, responsable de la couleur rousse des cheveux.
Phanères	Les phanères regroupent les poils, les cheveux et les ongles. Ils ont en commun d'être composés de kératine dure.
Photodermatose	Maladie cutanée déclenchée par l'exposition au soleil.
Photothérapie	Ensemble des méthodes de traitement utilisant la lumière pour soigner la peau : <ul style="list-style-type: none"> - Photothérapie UVA - Photothérapie UVB - Puvathérapie, Photothérapie dynamique.
Phototrichogramme	Technique utilisée pour quantifier les différents paramètres de la pousse des cheveux : <ul style="list-style-type: none"> - Densité totale de cheveux - Pourcentage de cheveux anagènes - Pourcentage de cheveux télogènes - Vitesse de pousse - Diamètre des cheveux Une petite zone de 0,36 à 1 cm ² est rasée puis photographiée immédiatement et 2 à 3 jours plus tard. La comparaison des 2 photographies permet de différencier les cheveux ayant poussé (cheveux anagènes) et ceux n'ayant pas poussé (cheveux télogènes).
Phtiriase	Pédiculose du pubis (voir pédiculose : lien vers cette fiche).
Piebaldisme	Dermatose héréditaire autosomique dominante associant une mèche frontale de cheveux blancs et des taches blanches variables au niveau de la peau.
Piedra	Maladie infectieuse des cheveux et des poils, caractérisée par la présence de petits nodules durs, irrégulièrement répartis le long des poils ou des cheveux (voir piedra blanche), (voir piedra noire).
Piedra blanche	Infection des poils ou des cheveux par un champignon : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Trichosporon cutaneum</i>, responsable de nodules blanchâtres, irrégulièrement répartis le long des poils ou des cheveux et plus visibles sur poils ou cheveux humides. La piedra blanche est rare mais peut se rencontrer partout dans le monde.
Piedra noire	Infection des poils ou des cheveux par un ascomycète (<i>Piedraia hortai</i>), responsable de nodules très durs et foncés. La piedra noire est endémique en zone tropicale.
Pili annulati	Voir cheveux annelés. (lien vers cette fiche).
Pili canulati	Cheveux ayant une ou plusieurs gouttières longitudinales, visibles en microscopie à lumière polarisée et surtout en microscopie électronique à balayage.

Pili incarnati	Poil incarné c'est-à-dire se développant sous la peau, responsable d'inflammation, essentiellement au niveau de la barbe.
Pili multigemini	Emergence à la surface du cuir chevelu de plusieurs tiges pilaires, par un seul orifice. Les tiges pilaires sont souvent aplatis ou triangulaires. Synonymes : <i>Trichostasis spinulosa</i> .
Pili torti	Cheveux aplatis, présentant un intervalle irrégulier des torsions de 180° le long de leur axe longitudinal.
Pili trianguli et canaliculi	Cheveux de section transversale, triangulaire, comportant une gouttière longitudinale, très régulière. Ces anomalies sont visibles en microscopie à polarisation et surtout en microscopie électronique à balayage. Cette anomalie est caractéristique du syndrome des cheveux incoiffables (voir ce terme : lien vers cette fiche).
Pityriasis	Desquamation de la peau en petites squames très fines.
Pityriasis capitis	Etat pelliculaire (voir pellicules : lien vers cette fiche). Synonyme : Pityriasis du cuir chevelu.
Pityriasis amiantacea	Voir fausse teigne amiantacée. (lien vers cette fiche).
Poliose	Décoloration d'une mèche de cheveux ou décoloration localisée des cils ou des sourcils.
Pou	Petit insecte d'environ 2 mm se nourrissant de sang et responsable de la pédiculose du cuir chevelu, du corps ou du pubis (voir pédiculose : lien vers cette fiche).
Propioni bactérium acnes	Bactérie vivant à l'intérieur des follicules sébacées jouant un rôle dans l'acné et parfois responsable de folliculite.
Prurit	Sensation de démangeaisons pouvant être localisées à la peau ou au cuir chevelu et entraînant fréquemment un grattage.
Pseudofolliculite de la barbe	Réaction de la barbe provoquée au niveau de la barbe par la pénétration dans la peau des extrémités des poils qui se recourbent et provoquent une réaction à un corps étranger. Plus fréquent chez les hommes de race noire. Synonyme : poil incarné, pili incarnati.
Pseudo-kyste pilonidal interdigital	Voir Trichogranulome des coiffeurs. (lien vers cette fiche).
Trichogranulome des coiffeurs	Petite lésion nodulaire siégeant entre les doigts des mains chez les coiffeurs, secondaire à la pénétration à travers la peau de petits fragments de cheveux coupés, responsables d'une réaction à corps étranger. Synonyme : kyste pilonidal des coiffeurs, pseudo-kyste pilonidal interdigital.
Pseudo pelade	Alopécie cicatricielle en petites plaques. A la différence de la pelade, la pseudo-pelade est cicatricielle c'est-à-dire que les racines sont détruites et que les repousses ne sont pas possibles. Le but du traitement sera de bloquer l'évolution. Les pseudo-pelades ou état pseudopeladique comprennent plusieurs maladies différentes : <ul style="list-style-type: none"> - La pseudo-pelade de Brocq - Le lichen plan pilaire - Le lupus érythémateux chronique - La sclérodermie - La sarcoïdose - ... Synonyme : Etat pseudo-peladique
Pseudo-pelade de Brocq	Pseudo-pelade de cause inconnue faite de petites plaques cicatricielles, claires ou discrètement rosées ayant tendance à s'étendre de façon centrifuge et à confluer les unes avec les autres. L'évolution est lente sur des mois et des années avec des périodes de stabilisation spontanée.
Pseudo-trichorrhexie noueuse	Trichorrhexie noueuse acquise, secondaire, en général à des soins cosmétiques excessifs : <ul style="list-style-type: none"> - Brossage - Chaleur - Défrisage - ... Synonyme : Trichorrhexie noueuse acquise
Psilose	Ancien terme signifiant alopécie. Synonyme : Alopécie, pitilose.
Psoriasis	Dermatose inflammatoire non inflammatoire, non contagieuse, faite de plaques rouges recouvertes de squames blanchâtres et siégeant surtout sur les coudes, les genoux, le bas du dos, parfois les mains et les pieds ainsi que les ongles et très souvent le cuir chevelu. (voir cette fiche)
Psychodermatose	Maladie cutanée dont l'apparition ou l'évolution est favorisée par des facteurs psychologiques Synonyme : Dermatose psychosomatique
Ptilose	Chute des cils. Ce terme vient du grec <i>Ptilôsis</i> qui signifie chute du plumage. Synonyme : Alopécie des cils.
PUVAthérapie	Traitement associant des UVA délivrés dans des cabines chez les dermatologues et la prise

	<p>préalable par la bouche de molécules appelées Psoralène qui permettent de renforcer l'efficacité thérapeutique des UVA.</p> <p>Cette technique peut être proposée comme traitement du psoriasis et parfois de la pelade.</p>
Queue du sourcil (signe de la)	Perte des poils de l'extrémité externe des 2 sourcils classiquement observée dans l'hypothyroïdie.
Queue faunesque	Hyperpilosité médiane localisée au bas du dos ou au-dessus des fesses, faite de longs poils pigmentés. Une queue faunesque doit faire rechercher par le médecin une éventuelle malformation sous-jacente.
RePUVAthérapie	<p>Photothérapie associant la PUVAthérapie (voir ce terme) et la prise de médicaments rétinoides par la bouche à petites doses permettant de rendre l'épiderme moins épais et augmentant l'action des Ultra-Violets.</p> <p>La RePUVAthérapie est beaucoup utilisée dans le psoriasis et permet de diminuer les doses d'UVA nécessaires.</p>
Rétinoïdes	<p>Médicaments de synthèse proches de la vitamine A naturelle.</p> <p>Les rétinoides sont utilisés par voie locale (Trétinoïne) en crème ou par voie orale en gélule pour traiter essentiellement les acnés sévères (Isotrétinoïne) et le psoriasis (Acitrétine).</p> <p>Ces médicaments sont tératogènes et peuvent augmenter les graisses dans le sang.</p>
Rétinoïque (acide)	<p>Un des premiers rétinoides synthétisés utilisés en application locale dans le traitement de l'acné, dans les troubles de la pigmentation, dans le vieillissement cutané. L'acide rétinoinique peut être irritant localement. Il existe sous forme de crème ou de lotion.</p> <p>Synonyme : Trétinoïne, vitamine A acide.</p>
Sabouraud	Raymond SABOURAUD est un dermatologue français professeur à l'Hôpital SAINT-LOUIS (1864-1938). Spécialiste des maladies du cuir chevelu, il a créé l'école des enfants teigneux à l'Hôpital SAINT-LOUIS. Il a découvert un milieu de cultures des champignons qui portent son nom. Il a publié de nombreux travaux sur les maladies du cuir chevelu. SABOURAUD est également sculpteur et 3 de ces bustes sont exposés au musée de l'Hôpital SAINT-LOUIS.
Sarcoïdose	<p>Maladie inflammatoire chronique d'étiologie inconnue, associant des ganglions, des lésions cutanées sous formes de petits nodules, de gros nodules, d'infiltrat et une atteinte fréquente pulmonaire mais également possible au niveau du foie, du squelette, du muscle, du cœur, du système nerveux, du rein, etc.</p> <p>Les sarcoïdoses cutanées sont de très bon pronostic.</p>
Scalp	<p>Chevelure et cuir chevelu arrachés du crâne soit accidentellement soit volontairement (scalp des indiens).</p> <p>A ne pas confondre avec le terme scalp anglo-saxon qui désigne le cuir chevelu.</p>
Sclérodermie	Maladie inflammatoire localisée ou généralisée réalisant une fibrose essentiellement au niveau de la peau mais parfois au niveau des poumons, des vaisseaux ou d'autres organes.
Sclérodermie en coup de sabre	Sclérodermie en bande réalisant une plaque allongée, fibreuse, déprimée, siégeant verticalement sur le front et pouvant s'étendre au niveau du cuir chevelu avec disparition des cheveux et au niveau du sourcil.
Sclérodermie en plaque	Sclérodermie localisée faite d'une ou plusieurs plaques qui deviennent infiltrées atteignant le plus souvent le tronc, le cou mais également le cuir chevelu avec une alopecie secondaire.
Sclérodermie localisée	Variété de sclérodermie n'atteignant que la peau et donc de bons pronostics. On distingue la sclérodermie en plaques ou Morphée et la sclérodermie en bandes, appelée au niveau du front : sclérodermie en « coup de sabre ».
Morphée	Synonyme de sclérodermie en plaques (voir sclérodermie localisée : lien vers cette fiche).
Sébocytes	Cellules sébacées présentes au sein des glandes sébacées et produisant le sébum.
Séborrhée	Sécrétion trop importante de sébum par les glandes sébacées, responsable d'une peau grasse et luisante.
Sébum	Sécrétion grasse des glandes sébacées qui, en quantité normale, protège la surface de la peau. La sécrétion du sébum peut être augmentée par les hormones masculines.
Shaving	Technique chirurgicale qui permet de retirer des lésions cutanées bénignes en relief grâce à un rasage parallèle à la peau avec une lame de bistouri. L'arrêt du saignement est obtenu grâce à un bistouri électrique ou grâce à un produit chimique et cette technique permet d'éviter les points de suture.
Siemens	Voir ichtyose bulleuse de Siemens.
Sinus pilonidal	<p>Réaction inflammatoire avec suppuration du fond du sillon inter-fessier secondaire à la pénétration de poils cassés qui se comportent comme des corps étrangers. Le sinus pilonidal est plus fréquemment observé chez les patients très poilus.</p> <p>Le sinus pilonidal est à différencier du kyste pilonidal d'origine embryonnaire. (voir kyste pilonidal)</p>
Sinus pilonidal des coiffeurs	Synonyme de Trichogranulome des coiffeurs.

Squame	Pellicule blanchâtre qui peut être détachée par la peau par grattage, secondaire à un épaissement de la couche superficielle de la peau et plus précisément de la couche cornée de l'épiderme.
Staphylococcie	Infection à staphylocoques. Les infections cutanées à staphylocoques regroupent : <ul style="list-style-type: none"> - Les folliculites, - Les furoncles, - Les anthrax, - Le sycosis, - Les panaris, - L'impétigo.
<i>Stratum corneum</i>	Couche superficielle de l'épiderme faite de cellules cornées, sans noyaux. <i>Le stratum corneum</i> protège l'ensemble de la peau des agressions extérieures. Synonyme : couche cornée
Sudation	Production de la sueur par les glandes sudorales.
Sueur	Liquide de transpiration légèrement salé, d'odeur particulière, sécrété à la surface de la peau par les glandes sudorales. La quantité excrétée augmente avec la chaleur et avec l'activité sportive.
Sycosis	Infection des poils, de la barbe ou de la moustache, secondaire soit à une bactérie : le staphylocoque, soit à un champignon (dermatophyte du genre <i>Trichophyton</i>).
Tâche rubis	Petites tâches très rouges parfois en discret relief liées à une prolifération localisée des vaisseaux sanguins et pouvant se développer avec l'âge partout sur la peau et sur le cuir chevelu. Les tâches rubis sont totalement bénignes et banales. Synonyme : angiome sénile ou angiome rubis
Teigne	Infection des cheveux et du cuir chevelu ou de la barbe ou d'autres zones pileuses, secondaire à des champignons <i>Microsporum</i> ou <i>Trichophyton</i> responsables d'une inflammation, d'une chute de cheveux et de cheveux cassés.
Teigne amiantacée	Voir fausse teigne amiantacée (lien vers cette fiche).
Teigne des duvets	Teigne inhabituelle et un peu atypique atteignant les duvets du visage sous forme de plaques bien limitées sans tendance à la guérison.
Teigne favique	Synonyme de favus (voir ce terme : lien vers cette fiche).
Télogène (phase)	Phase du cycle pileux au cours de laquelle le cheveu ou le poil ne pousse plus. Cette phase dure 3 mois au niveau du cuir chevelu puis le cheveu est éliminé.
Tige pileaire	Partie libre du poil ou du cheveu qui émerge de la peau. La tige pileaire est constituée de 3 couches : <ul style="list-style-type: none"> - La cuticule, la plus externe qui protège le cheveu, - Le cortex ou écorce, - La médullaire ou moelle centrale.
Tensure	Zone de cuir chevelu sans cheveux circulaire au sommet de la tête. La tonsure peut être volontaire chez les moines par exemple par rasage mais elle est le plus souvent secondaire à une calvitie masculine banale.
Tourbillon	Zone au sommet du cuir chevelu au centre de laquelle les cheveux poussent dans des directions opposées. Les lignes d'implantation des cheveux sont alors incurvées ou spiralées. Le tourbillon peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens. Il est possible d'observer un ou 2 tourbillons selon les individus.
Trachyonychie	Aspect rugueux de l'ongle avec des sillons longitudinaux et perte de la brillance.
Trétinoïne	Métabolite de la vitamine A utilisée localement pour le traitement de l'acné ou du vieillissement cutané. Synonyme : Vitamine A acide, acide-tout trans rétinolique
Trichiasis	Déviations des cils vers l'arrière frottant alors sur le globe oculaire.
Trichobactériose	Infection des poils axillaires ou des poils pubiens par une bactérie (du genre <i>Corynebacterium</i>) formant des gaines le long des tiges des poils.
Trichoclasie	Fracture anormale du cheveu réalisant un aspect en « bois vert », ébouriffé avec dissociation des fibres.
Trichodynie	Cuir chevelu douloureux, les douleurs peuvent être déclenchées par la mobilisation des cheveux ou le brossage et être accompagnées d'un cuir chevelu rouge.
Trichogramme	Technique d'examen au microscope ou au lecteur de microfiches des racines de cheveux arrachés permettant de quantifier le nombre de cheveux anagènes, catagènes et télogènes. Le trichogramme peut aider au diagnostic d'une chute de cheveux et établir son pronostic.
Trichonodose	Formation de nœuds sur les cheveux souvent rencontrés chez les sujets frisés ou bouclés et favorisés par des traitements capillaires agressifs.
Trichophytie	Infection cutanée secondaire à un champignon du genre <i>Trichophyton</i> .
Trichoptilose	Cheveux fendus à leur extrémité et séparés en deux ou plusieurs fragments, souvent observés chez les femmes aux cheveux longs et aggravés par des brossages intempestifs, des colorations

	et permanentes trop fréquentes. Synonyme : cheveux fourchus.
Trichorexie invaginée	Dilatation de la tige pileaire secondaire à l'invagination de la partie distale du cheveu dans la partie proximale. Ces anomalies bien visibles en microscopie optique à faible grossissement, sont associées au syndrome de Netherton. Synonyme : cheveux bambou, trichorrhexis invaginata
Trichorexie noueuse	Petite dilation des tiges pileaires secondaire à une rupture des cellules corticales de la couche externe du cheveu. Certains cas sont familiaux et peuvent être associés à des maladies. Le plus souvent, ces anomalies sont acquises, déclenchées par le brossage, le soleil et les soins cosmétiques. Synonyme : trichorrhexis nodosa
Trichorexomanie	Tic comportemental consistant à casser ses cheveux par des gestes répétés conscients ou non.
Trichorhinophalengien (Syndrome)	Maladie héréditaire à transmission autosomique dominante associant un nez un peu dilaté à son extrémité, en forme de poire, des doigts courts et une alopecie.
Trichoschisis	Fracture transversale très nette du cheveu observée dans les trichothiodystrophies
Trichosis	Développement anormal de poils sur une zone qui ne devrait pas en avoir.
Trichothiodystrophie	Anomalie héréditaire des cheveux secondaire à une diminution des acides aminés soufrés et responsable des cheveux fragiles et cassants. En microscopie, les cheveux sont aplatis et réguliers et en lumière polarisée, il existe une alternance caractéristique de bandes claires et foncées.
Trichotillomanie	Tic compulsif d'arrachage des cheveux, des poils, des cils et des sourcils. La trichotillomanie est le plus souvent consciente mais peut être cachée. Son pronostic est meilleur chez l'enfant que chez l'adulte.
Tumeur en turban	Voir Cylindrome (lien vers cette fiche : voir cette fiche).
Ulérythème ophryogène	Etat rouge et râpeux des sourcils et parfois des joues avec chute des sourcils. Synonyme : kératose pileaire, rouge atrophiante.
Ultraviolets (rayons)	Lumière invisible dont les longueurs d'onde se situent entre 190 et 400 μm . En dessous de la lumière violette, on distingue : <ul style="list-style-type: none"> - Les UVC de 200 à 290 μm - Les UVB de 290 à 320 μm - Les UVA de 320 à 400 μm Les UVA ne sont pas arrêtés par les vitres. Les UVA sont responsables des allergies solaires et les UVB sont les principaux responsables des coups de soleil. Les UVC sont arrêtés par l'ozone de la stratosphère.
Véllusphère	Cheveux fins de moins de 40 μm de diamètre. Synonyme : cheveux-duvets.
Verneuil (Maladie de)	Infection chronique et récidivante siégeant sous les bras, entre les fesses et aux plis de l'aîne liée probablement à une obstruction des follicules pilo-sébacés et des glandes sudorales. Le traitement en est difficile. Synonyme : Hidradénite suppurée
Vertex	Sommet du crâne, zone se dégarnissant en priorité lors de la calvitie. Voir tonsure : lien vers cette fiche
Vitiligo	Maladie cutanée bénigne d'origine auto-immune caractérisée par l'apparition de taches dépigmentées très bien limitées. Quand le vitiligo atteint le cuir chevelu, les cheveux implantés sur une tache dépigmentée sont le plus souvent décolorés.
Woolly Hair Naevus	Malformation capillaire se traduisant par l'apparition chez l'enfant de race blanche, d'une ou de plusieurs zones localisées de cheveux crépus, laineux et difficile à coiffer. Ces cheveux sont habituellement plus fins avec des sections transversales, ovalaires, triangulaires ou irrégulières. Voir aussi cheveux laineux : lien vers cette fiche).
Xérodermie	Etat d'une peau très sèche.
Xérose	Etat de sécheresse de la peau.